

Fiche d'information : scintigraphie thyroïdienne

Déroulement de l'examen (durée sur place environ 1h30) :

Il n'y a pas de préparation particulière, notamment pas besoin d'être à jeun.

A votre arrivée, une faible dose d'un produit radioactif vous sera injectée par voie intra-veineuse.

Quelques minutes après cette injection, des images de votre thyroïde seront réalisées à l'aide d'une caméra permettant de détecter le produit radioactif, pendant environ 10 minutes.

Consignes préalables :

Si vous prenez des traitements pour la thyroïde, il est préférable de les interrompre avant l'examen :

- LEVOTHYROX : 15 jours avant l'examen
- CYNOMEL : 2 jours avant l'examen
- NEOMERCAZOLE / CARBIMAZOLE : 10 jours avant l'examen
- PROPYLEX : 3 jours avant l'examen
- BASDENE : 8 jours avant

Contre-indications :

Mesdames, si vous êtes enceinte ou susceptible de l'être, ou si vous allaitez, merci de le signaler par avance ou, à défaut, dès votre arrivée dans le service.

Certains lieux comportent des détecteurs de radioactivité (aéroports, installations nucléaires...) que vous pouvez déclencher parfois plusieurs jours après l'examen. Un certificat indiquant l'élément radioactif qui vous a été administré peut vous être fourni sur demande.

Pour plus d'information :

